

中国苔草属菱形果组新资料(2)*

梁松筠

(中国科学院植物研究所 北京 100093)

NEW MATERIAL OF CAREX SECTION RHOMBOIDALES FROM CHINA(2)

LIANG Song-Yun

(Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093)

Key words *Carex* section Rhomboidales; *C. kaoi*; *C. nanchuanensis*; *C. cheniana*; *C. funingensis*; *C. pseudo-laticeps*; *C. kuchunensis*; *C. longerostrata* var. *hoi*; *C. simulans* var. *densiflora*; *C. manca* subsp. *jiuhuaensis*; *C. manca* subsp. *wichurai*

关键词 苔草属菱形果组; 高氏苔草; 南川苔草; 陈氏苔草; 富宁苔草; 弥勒山苔草; 古城苔草; 城湾苔草(变种); 密花相仿苔草(变种); 九华山苔草(亚种); 澳门苔草(亚种)

1 高氏苔草 新种 图 1:1~5

Carex kaoi Tang et Wang in herb. sp. nov. TYPE: Guangdong(广东), Ruyuan(乳源), at the margins of forests, 1933-05-13, X. P. Gao(高锡朋)52564(holotype, PE).

Haec species *C. hastatae* Kükenth. affinis, sed culmis 7~13 cm altis, foliis 10~15 mm latis differt.

Herba perennis. Rhizoma breve, lignosum. Culmus lateralis, 7~13 cm altus, compresso-triqueter, laevis, flexus, basi vaginis 3~4 aphyllis viridibus obtectus. Folia culmo multo longiora 10~15 mm lata, plana, marginibus scabra, acuminata. Bractae vaginant, breviter laminiferae, spiculae 3~4, approximatae, pedunculatae, terminalis staminata, claviformis, 6~8 mm longa; laterales pistillatae 2~3, ovatae, 10 mm longae, 7 mm latae, sub-laxi-(5~7) florum. Squamae pistillatae ovato-lanceolatae, flavo-pallidae, dorso viriditrinerves, nervis in aristam excurrentes. Utriculi squamas superantes, oblique patentes, rhomboidales, obtuse trigoni, 7~8 mm longi, papyracei, flavo-virides, glabri, multinerves, basi attenuati, apice in rostrum 2.5 mm longum, bidentatum sensim abeuntes. Nux arcte inclusa rhomboidali-ellipsoidea, trigona, ca. 5 mm longa, atro-purpurea, medio constricta, curvatim stipitata, apice in rostrum 1 mm longum abrupte contracta. Stylus basi subincrassatus. Stigmata 3.

多年生草本。根状茎短, 木质。秆侧生, 高 7~13 cm, 扁三棱形, 平滑, 弯曲, 基部具 3~4 枚无叶片的绿色叶鞘。叶极长于秆, 宽 10~15 mm, 平张, 边缘粗糙, 先端渐尖。苞片短叶状, 具鞘。小穗 3~4 个, 彼此靠近, 具小穗柄, 顶生一个雄性, 棍棒状, 长 6~8 mm; 侧生雌小穗 2~3 个, 卵形, 长 10 mm, 宽 7 mm, 花稀疏(5~7 朵)。雌花鳞片卵状披针形, 黄白色, 背面 3 脉绿色延伸成芒尖。果囊长于鳞片, 斜展, 菱形, 钝三棱形, 长 7~8 mm, 纸质, 黄绿色, 无毛, 具多脉, 基部渐狭, 上部渐缩成长喙, 喙长 2.5 mm, 口具 2 齿。小坚果紧

* 国家自然科学基金资助重大项目, "三志"编研内容之一。

1998-06-17 收稿, 1998-08-01 收修改稿。




图1 高氏苔草 1. 植株; 2. 雄花鳞片; 3. 雌花鳞片; 4. 果囊; 5. 小坚果。6~10. 南川苔草 6. 雌小穗; 7. 雄花鳞片; 8. 雌花鳞片; 9. 果囊; 10. 小坚果。(王金凤 绘, 冀朝楨 抄)

Fig. 1 1~5. *Carex kaoi* 1. Plant; 2. Staminate scale; 3. Pistillate scale; 4. Utricle; 5. Nut. 6~10. *C. nanchuanensis* 6. Pistillate spike; 7. Staminate scale; 8. Pistillate scale; 9. Utricle; 10. Nut.

包于果囊中,菱状椭圆形,三棱形,长约 5 mm,黑紫色,中部棱边缢缩,基部具弯柄,先端急缩成长喙,喙长约 1 mm;花柱基部稍变粗,柱头 3。

本种与戟叶苔草 *C. hastata* Kükenth. 相近,不同在于秆较矮,高 7~13 cm。叶宽 10~15 mm。

2 南川苔草 新种 图 1:6~10

Carex nanchuanensis Chü in herb. sp. nov. TYPE: Sichuan(四川), Nanchuan(南川), in grassy, rocky places, alt. 2050 m, 1935-06-12, K. L. Chü 1298(holotype, PE).

Proxima *C. thibeticae* Franch., a qua spiculis pistillatis interdum apice floribus staminatis paucis instructis, utriculis subglobosis, nervis prominentibus differt.

Herba perennis. Rhizoma breve, lignosum, firmum. Culmus lateralis, 20~35 cm altus, compresso-triqueter, laevis, basi vaginis atro-brunneis in fibras solutis obtectus. Folia culmo longiora 1.2~1.8 mm lata, plana, viridia, supra marginibus scabra. Bractaeae longe vaginantae, breviter laminiferae, marginibus scabrae. Spiculae 4~5, terminalis staminata, claviformi-cylindrica, 2.2~3 cm longa, laterales pistillatae 3~4, interdum apice floribus staminatis paucis instructis, cylindricae, 4~5.5 cm longae, 1.5 cm latae, densiflorae, pedunculatae erectae. Squamae pistillatae lanceolatae, rigidae ca. 6 mm longae, flavo-pallidae, dorso viridi-trinerves nervis apice in mucronem excurrentes. Utriculi squamis longiores, oblique patentes, subglobosi (rostro excepto) 6~7 mm longi(rostro incluso), membranacei, flavo-virides, parce pubescentes, nervibus prominentes, basi roundi, apice in rostrum longum cylindricum ore bidentatum abrupte abeuntes. Nux arcte inclusa subglobosa, trigona, 2 mm longa, medio constricta, inferne lateribus excavata, atro-purpurea, apice in rostrum breve curvum abrupte contracta. Stylus basi haud mcrassatus. Stigmata 3.

多年生草本。根状茎短,木质,坚硬。秆侧生,高 20~35 cm,扁三棱形,平滑,基部叶鞘暗棕色分裂成纤维状。叶长于秆,宽 1.2~1.8 mm,平张,绿色,上部边缘粗糙。苞片短叶状,边缘粗糙,具长鞘。小穗 4~5 个,顶生 1 个雄性,棍棒状圆柱形,长 2.2~3 cm;侧生 3~4 个雌性,有时顶端有少数雄花,圆柱形,长 4~5.5 cm,宽 1.5 cm,花密生,小穗柄直立。雌花鳞片披针形,坚挺,长约 6 mm,黄白色,背面 3 脉深绿色,向顶延伸成短尖。果囊长于鳞片,斜展,近球形(喙除外),长 6~7 mm(连喙),膜质,黄绿色,稍被毛,脉极隆起,基部圆形,上部急缩成长喙,喙圆筒形,口具 2 齿。小坚果紧包于果囊中,近球形,三棱形,长 2 mm,棱边中部缢缩,下部侧面凹陷,暗紫色,顶端喙短,弯曲;花柱基部不膨大,柱头 3。

本种与藏苔草 *C. thibetica* Franch. 相近,但雌小穗顶端有时具少数雄花。果囊近球形。脉极隆起而不同。

3 陈氏苔草 新种 图 2:1~5

Carex cheniana Tang et Wang in herb. sp. nov. TYPE: Zhejiang(浙江), Longquan(龙泉), mountain slope, under forests, 1934-05-18, S. Chen(陈氏)3173(holotype, PE).

Affinis *C. saxicolae* Tang et Wang, a qua utriculis squamis brevioribus, nucis rostro curvo differt.

Herba perennis. Rhizoma breve. Culmus 40~60 cm altus, triqueter, laevis. Folia culmo longiora vel breviora, 5~9 mm lata, plana, marginibus revoluta, superne scabra, apice sensim attenuata. Bractaeae foliaceae longe vaginantae. Spiculae 4~5, remotae, terminalis staminata, claviformis, 1~2.8 cm longa; laterales pistillatae 3~4, apice floribus staminatis paucis instructis, cylindricae, 3.5~6 cm longae, 5~8 mm latae, densiflorae. Squamae pis-




图2 陈氏苔草 1. 植株; 2. 雄花鳞片; 3. 雌花鳞片; 4. 果囊; 5. 小坚果。6~8. 富宁苔草 6. 雌花鳞片; 7. 果囊; 8. 小坚果。(王金凤 绘, 冀朝祯 抄)

Fig. 1 1~5. *Carex cheniana* 1. Plant; 2. Staminate scale; 3. Pistillate scale; 4. Utricle; 5. Nut.

6~8. *C. funingensis* 6. Pistillate scale; 7. Utricle; 8. Nut.

tillatae ovato-lanceolatae, 7.5 ~ 10 mm longae, nitidae, glabrae, pallidae, dorso viridi-trinerves nervis apice in aristam longam scabram excurrentes. Utriculi squamis breviores, oblique patentes, rhomboidali-ellipsoidei(rostro excepto), trigoni, 7 ~ 7.5 mm longi(rostro incluso), coriacei, fulvi, parce pubescentes, multinerves, basi attenuati, apice in rostrum 4 mm longum ore profunde bidentatum abrupte abeuntes. Nux arcte inclusa rhomboidali-ellipsoidea, trigona, 3 mm longa, medio constricta, inferne lateribus concavis, curvatim stipitata, apice in rostrum breve curvum abrupt contracta. Stylus basi subincrassatus. Stigmata 3.

多年生草本。根状茎短,秆高 40 ~ 60 cm,三棱形,平滑。叶长于或短于秆,宽 5 ~ 9 mm,平张,边缘反卷,上部边缘粗糙,先端渐狭。苞片叶状,具长鞘。小穗 4 ~ 5 个,顶生 1 个雄性,棍棒状圆柱形,长 1 ~ 2.8 cm;侧生 3 ~ 4 个雌性,顶端有雄花,圆柱形,长 3.5 ~ 6 cm,宽 5 ~ 8 mm,花密生。雌花鳞片卵状披针形,长 7.5 ~ 10 mm,光亮,无毛,苍白色,背面 3 脉绿色延伸成长芒。果囊短于鳞片,斜展,菱状椭圆形(喙除外),三棱形,长 7 ~ 7.5 mm(连喙),草质,黄褐色,被疏柔毛,具多脉,基部渐狭,上部急缩成长喙,喙长 4 mm,口具 2 齿。小坚果紧包于果囊中,菱状椭圆形,三棱状,长 3 mm,中部棱上缢缩,下部侧面凹陷,具弯曲的柄,顶端急缩成短喙,喙弯曲;花柱基部稍膨大,柱头 3。

本种与岩生苔草 *C. saxicola* Tang et Wang 相近,但果囊短于鳞片。小坚果喙弯而不同。

4 富宁苔草 新种 图 2:6~8

Carex funingensis Tang et Wang in herb. sp. nov. TYPE: Yunnan(云南), Funing(富宁), under dense woods, alt. 1100 m, 1940-04-12, C. W. Wang(王启无)88389(holotype, PE).

Species *C. harlandii* Boott affinis, sed spicula pistillata 1, squamis pistillatis ovatis, utriculis parce pubescentibus differt.

Herba perennis. Rhizoma breve, lignosum. Culmus lateralis, 40 cm altus, compresso-triqueter, laevis, basi vaginis atro-brunneis in fibras solutis obtectus. Folia culmo longiora, 7 ~ 9 mm lata, plana, supra vel marginibus scabra, apice attenuata. Bractee foliaceae haud vaginantae. Spicula pistillatae 1, cylindrica, 5.5 cm longa, ca. 1 cm lata, pedunculata. Squamae pistillatae lanceolatae, 6 ~ 8 mm longae, flavo-pallidae, dorso viridi-trinerves nervis apice in aristam longam scabram excurrentes. Utriculi squamas superantes, oblique patentes, ovati(rostro excepto), 7 ~ 7.5 cm longi(rostro incluso), papyracei, virides, parce pubescentes, prominentes multinerves apice in rostrum longum ore profunde bidentatum abrupte abeuntes. Nux arcte inclusa, ovata, trigona, 4 mm longa, fulva, medio constricta, inferne lateribus excavata, breve curvatim stipitata, apice in rostrum 1.5 mm longum, cylindricum, apice annulatum abrupte desinens. Stylus basi haud incrassatus. Stigmata 3.

多年生草本。根状茎短,木质。秆侧生,高达 40 cm,扁三棱形,平滑,基部具暗褐色细裂成纤维状的叶鞘。叶长于秆,宽 7 ~ 9 mm,平张,表面粗糙,上部边缘具细齿,先端渐狭。苞片叶状,无鞘。小穗 1 个,雌性,顶端无雄花,圆柱状,长 5.5 cm,宽约 1 cm,具小穗柄。雌花鳞片披针形,长 6 ~ 8 mm,黄白色,背面 3 脉绿色,向顶渐狭成粗糙长芒。果囊长于鳞片,斜展,卵形(喙除外),长 7 ~ 7.5 mm(连喙),纸质,绿色,被稀疏柔毛,具多条隆起的脉,先端急缩成长喙,口具 2 长齿。小坚果紧包于果囊中,卵形,三棱状,长约 4 mm,黄褐色,中部棱边缢缩,下部侧面凹陷,基部柄弯曲,上部急缩成喙,圆柱形,喙长 1.5 mm,




图3 弥勒山苔草 1. 植株; 2. 雄花鳞片; 3. 雌花鳞片; 4. 果囊; 5. 小坚果。6~10. 古城苔草 6. 侧生小穗; 7. 雄花鳞片; 8. 雌花鳞片; 9. 果囊; 10. 小坚果。(王金凤 绘, 冀朝楨 抄)

Fig.3 1~5. *Carex pseudo-laticepta* 1. Plant; 2. Staminate scale; 3. Pistillate scale; 4. Utricle; 5. Nut. 6~10. *C. kuchunensis* 6. Lateral spike; 7. Staminate scale; 8. Pistillate scale; 9. Utricle; 10. Nut.

顶端膨大;花柱基部不膨大,柱头 3。

本种与长囊苔草 *C. harlandii* Boott 相近,但小穗 1 个,雌性,雌花鳞片卵形,果囊被稀疏柔毛易于区别。

5 弥勒山苔草 新种 图 3:1~5

Carex pseudo-laticeps Tang et Wang in herb. sp. nov. TYPE: Hongkong (香港), Milesan(弥勒山) on rocks, C. L. Tso(左景烈)20216(holotype, PE).

Haec species *C. laticipi* C. B. Clarke ex Franch. affinis, sed foliis 6~10 mm latis, spiculis pistillatis 3, nucis rostro erecto differt.

Herba perennis. Rhizoma breve, lignosum. Culmus 33 cm altus, triqueter, pilosus, basi vaginis atro-brunneis in fibras solutis obtectus. Folia culmo longiora, 6~10 mm lata, plana, pubescentia, apice attenuata. Bractee vaginantae, breviter laminiferae, pilosae. Spiculae 4, approximatae, terminalia staminata, lineari-cylindrica, 3.5 cm longa, longe pedunculata, pilosa; laterales pistillatae 3, apice floribus staminatis instructae, cylindricae, 2.5~4.2 cm longae, densiflorae, pedunculatae, pilosae. Squamae pistillatae lanceolatae, ca. 5 mm longae, flavo-pallidae, pilosae, dorso viridi-trinerves nervis apice in mucronem excurrentes. Utriculi squamas superantes, oblique patentes, ovoideo-ellipsoidei, trigoni, 8 mm longi, subcoriacei, fulvi, pilosi, multinerves, basi attenuati, apice in rostrum longum ore profunde bidentatum abrupte abeuntes. Nux arcte inclusa, subrhomboidali-obvoidea, 3~4 mm longa, atro-purpurea, medio constricta, inferne lateribus excavata, oblique stipitata, apice in rostrum 1.5 mm longum erectum abrupte abeuntes. Stylus basi subincrassatus. Stigmata 3.

多年生草本。根状茎短,木质。秆高 33 cm,三棱形,被柔毛,基部具暗褐色分裂成纤维状的叶鞘。叶长于秆,宽 6~10 mm,平张,叶两面被柔毛,顶端渐狭。苞片短叶状,被柔毛,具鞘。小穗 4 个,彼此靠近,顶生 1 个雄性,线状圆柱形,长 3.5 cm;小穗柄较长,被柔毛;侧生 3 个雌性,顶端有雄花,圆柱形,长 2.5~4.2 cm,花密生,小穗柄被柔毛。雌花鳞片披针形,长约 5 mm,黄白色,被柔毛,背面 3 脉绿色延伸成短尖。果囊长于鳞片,斜展,卵状椭圆形,三棱形,长 8 mm,近革质,黄褐色,密被柔毛,具多脉,基部渐狭,上部急缩成长喙,喙口具 2 齿。小坚果紧包于果囊中,近菱状倒卵形,长 3~4 mm,黑紫色,中部棱边缢缩,下部侧面凹陷,基部柄歪,先端急缩成直立的长喙,喙长 1.5 mm,花柱基部膨大,柱头 3。

本种与弯喙苔草 *C. laticeps* C. B. Clarke ex Franch. 相近,不同在于叶宽 6~10 mm,雌小穗 3 个,小坚果喙直而异。

6 古城苔草 新种 图 3:6~10

Carex kuchunensis Tang et Wang in herb. sp. nov. TYPE: Guangxi(广西), on rocks by stream or under woods, alt. 900 m, s. coll. 21234(holotype, PE), s. coll. 20196(PE).

Affinis *C. brevicuspidi* C. B. Clarke, a qua parte superiore staminata 2/3 spiculae pistillatae lateralis saepe attingente, squamis pistillatae ovato-lanceolatis, stylo basi incrassato differt.

Herba perennis. Rhizoma breve, lignosum. Culmus 50~75 cm altus, compresso-triqueter, laevis, ad basin vaginis atro-brunneis vestitus. Folia culmo longiora, 6~8 mm lata, plana, marginibus scabra, coriacea. Bractee vaginantae, breviter laminiferae. Spiculae 4~5, remotae, terminalis staminata lineari-cylindrica, 5~7.5 cm longa, longe pedunculata;

laterales 3~4 pistillatae (parte superiore staminata 2/3 spiculae saepe attingenti), cylindricae, 5~7.5 cm longae, pedunculo 1.5~8.5 cm longo. Squamae pistillatae ovato-lanceolatae, apice attenuatae, 5~6 mm longae, fulvo-virides, dorso viridi-trinerves. Utriculi squamas superantes, ovati (rosto excepto), 6~7 mm longi (rostrum incluso), fulvi, coriacei, glabri, multinerves, basi contracri, apice in rostrum 4 mm longum ore profunde bidentatum abrupte abeuntes. Nux arcte inclusa, ovata, trigona, 2.5 mm longa, atro-purpurea, curvatum stipitata, medio constricta, inferne lateribus excavata, apice in rostrum curvum abrupte contracta. Stylus basi incrassatus. Stigmata 3.

多年生草本。根状茎短, 木质。秆高 50~75 cm, 扁三棱形, 平滑, 基部叶鞘深褐色。叶长于秆, 宽 6~8 mm, 平张, 边缘粗糙, 革质。苞片短叶状, 具长鞘。小穗 4~5 个, 远离, 顶端 1 个雄性, 线状圆柱形, 长 7~7.5 cm, 小穗柄长; 侧生小穗雌性 (上部雄花部分常达 2/3) 3~4 个, 圆柱形, 长 5~7.5 cm; 小穗柄长 1.5~8.5 cm。雌花鳞片卵状披针形, 先端渐狭, 长 5~6 mm, 黄绿色, 背面 3 脉绿色。果囊长于鳞片, 卵形 (喙除外), 长 6~7 mm (连喙), 黄褐色, 革质, 无毛, 具多脉, 基部收缩, 上部急缩成长喙, 喙长 4 mm, 口深裂为 2 长齿。小坚果紧包于果囊中, 卵形, 三棱状, 长 2.5 mm, 黑紫色, 具弯柄, 中部棱边缢缩, 下部侧面凹陷, 先端急缩成喙, 喙弯曲, 花柱基部膨大, 柱头 3。

本种与短尖苔草 *C. brevicuspis* C. B. Clarke 相近, 但侧生小穗上部的雄花部分通常长达小穗的 2/3, 雌花鳞片卵状披针形, 花柱基部膨大易于区别。

7 城湾苔草 新变种

Carex longerostrata C. A. Mey. var. **hoi** Chü in herb. var. nov. TYPE: Zhejiang (浙江), 1932-04-19, Y. Y. He (贺贤育) 943 (holotype PE).

Haec varietas a var. *longerostratae* differ utriculis glabris, nucis rostro erecto.

与原变种的区别在于果囊无毛。小坚果的喙直。

8 密花相仿苔草 新变种

Carex simulans C. B. Clarke var. **densiflora** Tang et Wang, in herb. var. nov. TYPE: Sichuan (四川), Xichang (西昌), under woods, alt. 2050 m, 1932-06-25, T. T. YU 1119 (holotype, PE).

A var. *simulanti* differt spiculis pistillatis densifloris, squamis pistillatis marginibus pallidis, aristis longis, nucis rostro longo.

本种与原变种的区别在于雌小穗花密生, 雌花鳞片边缘白色, 具长芒, 小坚果喙长。

9 九华苔草 亚种 新组合

Carex manca Boott subsp. **jiuhuaensis** (S. W. Su) S. Y. Liang, comb. nov.

C. jiuhuaensis S. W. Su in Bull. Bot. Res. 10(4):5. Fig. 1. 1990. TYPE: Anhui (安徽), Jiuhuashan (九华山), Tiantai (天台), 1980-05-13, S. W. Su 80038 (holotype, ANU).

10 澳门苔草 亚种 新组合

Carex manca Boott subsp. **wichurai** (Boeck.) S. Y. Liang, comb. nov.

C. wichurai Boeck. in Bot. Jahrb. 5: 519. 1884. TYPE: Macao (澳门), Wichura no. 1704 (Herb. Mus. Bot. Berlin)

C. manca Boott var. *wichurai* Kükenth. in Engl. Pflanzenr. Heft 38 IV. 20. 629. 1909.